

IV AMOSTRA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DO CURSO DE FISIOTERAPIA

RESUMOS – ANAIS DE EVENTO

REVISTA InterAção | v. 17, n. 4, 2024 | ISSN 1981-2183

FAM
CENTRO UNIVERSITÁRIO



CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS AMÉRICAS – FAM

**TRABALHOS DE CONCLUSÃO DO CURSO DE
FISIOTERAPIA**

**APRESENTAÇÃO PÚBLICA
4º CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA FAM 2023**

REITORA

Dr^a. Leila Mejdalani Pereira

PRÓ-REITOR

Prof. Dr. Luís Antônio Baffile Leoni

COORDENADOR GERAL DOS CURSOS PRESENCIAIS

Prof^a. Me^a. Camila Lopes Vaiano

COORDENADORA DE PESQUISA E EXTENSÃO

Prof^a. Me^a. Ana Lúcia Sanchez de Lima Ventura

COORDENADORA DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FAM

Prof.^a Me^a. Cristina Prota

EDITOR CHEFE

Prof. Dr. Luís Antônio Baffile Leoni

DIRETOR OPERACIONAL

Michael Baleeiro Bonfim, FAM, São Paulo, SP, Brasil

EDITORES ASSOCIADOS

Prof.^a Me. Lúcia Helena Storer Ribeiro

Prof.^a Me. Cristina Prota

Prof^o Me. Sérgio Ayama

ORGANIZAÇÃO DO EVENTO

Prof^ª Me. Cibele Almeida SANTOS
Prof^ª Me Cristina Prota
Prof^ª Esp. Fernanda De Cássia Pereira Da Mata
Prof^ª Esp. Fernanda Patrícia Borges Amaral
Prof^ª Esp. Gabriela Da Silva Chaves
Prof^ª Dr^ª Juliana Valente Francica Grilletti
Prof^ª Me. Lúcia Helena Storer Ribeiro
Prof^º Me. Sérgio Ayama

BANCAS AVALIADORAS

Prof^ª Esp. Arianne Lopes Dos Santos
Prof^º Me Aldanubes Riccomini Junior
Prof^ª Me. Cibele Almeida SANTOS
Prof^ª Esp. Fernanda De Cássia Pereira Da Mata
Prof^ª Esp. Fernanda Patrícia Borges Amaral
Prof^ª Esp. Gabriela Da Silva Chaves
Prof^º Dr^º Henry Dan Kyomoto
Prof^ª Esp. Jenniffer Grace Barros Alvino
Prof^ª Esp . Jordana Reis Da Silva
Prof^ª Me. Julia Márcia Magalhães Caleiro
Prof^ª Dr^ª Maria Eugênia Mayr De Biase
Prof^ª Me Marcelle Guerra Vieira Moisés Velloso
Prof^º Rafael Cusatis Neto
Prof^ª Dr^ª Renata Calhes Ffranco De Moura
Prof^ª Me Silmara Patrícia Corrêa Da Silva Macri

DIVULGAÇÃO

Agência Panda

LOCAL DO EVENTO E REALIZAÇÃO

Centro Universitário da Américas – FAM
Rua Augusta, 1508. Consolação, São Paulo/SP. Cep: 01304-001

**OBSERVAÇÃO: TODOS OS CONTEÚDOS DOS TRABALHOS
DESENVOLVIDOS E APRESENTADOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS
AUTORES.**



***EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA, TODOS OS
CONTEÚDOS SÃO LICENCIADOS SOB UMA LICENÇA:
CREATIVE COMMONS - ATRIBUIÇÃO-NÃOCOMERCIAL 4.0
INTERNACIONAL.***

SUMÁRIO

ESTUDO COMPARATIVO: AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÒRIA EM DIFERENTES GRUPOS POPULACIONAIS TABAGISTAS E NÃO TABAGISTAS.....	5
O IMPACTO DA MUSICOTERAPIA NA ABORDAGEM TERAPÊUTICA NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.....	7
ABORDAGENS FISIOTERAPÊUTICAS EM PACIENTES PÓS-COVID-19 COM COMPROMETIMENTO PULMONAR.....	8
ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NAS PRINCIPAIS DISFUNÇÕES SEXUAIS FEMININAS - UMA REVISÃO INTEGRATIVA	10
LESÕES PULMONARES ASSOCIADAS AO USO DE CIGARRO ELETRÔNICO (EVALI) - REVISÃO LITERÁRIA.....	12
ABORDAGEM DA FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DA ASMA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: REVISÃO LITERÁRIA.....	13
O USO DO LASER PARA TRATAR A DISTROFIA VAGINAL.....	15
FATORES FUNCIONAIS QUE LEVAM A UMA REVISÃO DE PRÓTESE TOTAL DO QUADRIL PRECOCE	17
TRATAMENTO CONSERVADOR EM RUPTURA PARCIAL DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA): REVISÃO LITERÁRIA	19

ESTUDO COMPARATIVO: AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA EM DIFERENTES GRUPOS POPULACIONAIS TABAGISTAS E NÃO TABAGISTAS

Letícia Vieira Costa¹

Marcel Felipe Pagliocchi¹

Sabrina Roberta Alves Miranda Teixeira¹

Yasmin Barbosa Cruz¹

Marcelle Guerra²

1 Discente, Curso de Fisioterapia, Centro Universitário das Américas – FAM

2 Docente, Curso de Fisioterapia, Centro Universitário das Américas – FAM

RESUMO

Introdução: O tabagismo é um problema de saúde pública global, associado a uma série de complicações respiratórias. Este estudo visa avaliar a força muscular respiratória em indivíduos tabagistas e não tabagistas, utilizando a manovacuometria como ferramenta de análise. A importância desta pesquisa reside na compreensão dos efeitos do tabagismo na função respiratória, contribuindo para estratégias de prevenção e intervenção. **Objetivo:** Comparar a força muscular respiratória, medindo as variáveis P_{Imáx} e P_{Emáx}, entre indivíduos tabagistas e não tabagistas, proporcionando insights sobre o impacto do tabagismo na função pulmonar. **Metodologia:** A pesquisa foi conduzida por meio de uma revisão da literatura, comparando estudos relevantes sobre a avaliação da força muscular respiratória em contextos tabagistas e não tabagistas. Foram incluídos artigos científicos, relatórios e dados de organizações de saúde. **Resultados:** Foram analisados 5 artigos e os resultados demonstraram diferenças estatisticamente significantes em 4 deles em relação a diminuição da P_{Imáx} do grupo tabagista quando comparado ao grupo não tabagista. **Conclusão:** Com base na análise dos artigos analisados, ficou evidenciado que o tabagismo está associado a uma diminuição na força muscular respiratória, conforme evidenciado pelas diferenças significativas observadas nas variáveis P_{Imáx} e P_{Emáx}. No entanto, sabemos que o número de artigos analisados neste trabalho é insuficiente para podermos afirmar tal conclusão, portanto, sugerimos que novas pesquisas sejam realizadas a fim de podermos evidenciar este

achado.

Palavras-chave: Força muscular respiratória; Tabagismo; Manovacuometria; Pimáx; PEmax.

O IMPACTO DA MUSICOTERAPIA NA ABORDAGEM TERAPÊUTICA NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Bruna Almeida Lucas¹

Kathleen Janaína de Sousa Lima¹

Thais Oliveira Almeida¹

Victoria Regina Medeiros¹

Cibele Almeida Santos²

Renata Calhes Franco de Moura²

1 Discente, Curso de Fisioterapia, Centro Universitário das Américas – FAM

2 Docente, Curso de Fisioterapia, Centro Universitário das Américas – FAM

RESUMO

Introdução: O transtorno do espectro autista (TEA) é definido como um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por déficits na comunicação e interação social. A Musicoterapia possui aspectos diversos de abordagem multifatorial, é uma prática clínica de tratamento e intervenção terapêutica na criança portadora de TEA. **Materiais e Métodos:** Trata-se de uma revisão da literatura segundo as recomendações do PRISMA e busca elaborada através da estratégia do PICO, sobre a influência da fisioterapia e os benefícios da musicoterapia no aspecto motor e cognitivo de crianças com TEA. **Resultados:** Através de busca bibliográfica realizar uma análise de estudos que utilizam a musicoterapia como intervenção terapêutica na criança portadora de TEA. **Objetivo:** Analisando os objetivos da intervenção e seus resultados no desenvolvimento neuropsicomotor das crianças. **Conclusão:** Os estudos analisados, mostraram que a musicoterapia como um recurso terapêutico à demanda motora da criança com TEA, potencializa o ganho de força muscular, otimiza a coordenação do movimento, aprimora o afeto e a interação social.

Palavras-chave: Fisioterapia; Transtorno do Espectro Autista (TEA); Musicoterapia; Coordenação Motora; Comunicação social.

ABORDAGENS FISIOTERAPÊUTICAS EM PACIENTES PÓS-COVID-19 COM COMPROMETIMENTO PULMONAR.

Igor Honório Ribeiro¹

Sergio Ayama²

1 Discente, Curso de Fisioterapia, Centro Universitário das Américas – FAM

2 Docente, Curso de Fisioterapia, Centro Universitário das Américas – FAM

RESUMO

Introdução: A COVID-19 é uma infecção causada pelo Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (SARS-CoV-2), que apareceu pela primeira vez em 2019 e trouxe resultados negativos na funcionalidade em milhares de afetados, deixando comprometimento pulmonar como uma das características principais da infecção viral. Embora o COVID-19 tenha desafiado o sistema de saúde, se destacou a necessidade da fisioterapia principalmente em pacientes pós COVID-19 que apresentam sequelas funcionais de médio e longo prazo. **Objetivo:** Investigar diferentes abordagens fisioterapêuticas, para o tratamento de pacientes pós-COVID-19 com comprometimento pulmonar. **Métodos:** Trata-se de uma revisão sistemática da literatura feita com artigos das seguintes bases de dados: PubMed/MedLine, SciELO, Lilacs, PEDro. Foram incluídos nessa revisão os ensaios clínicos e relatos de casos; publicados em língua portuguesa e inglesa; dos últimos 3 anos que abordassem o efeito da fisioterapia em pacientes pós- COVID-19 com comprometimento pulmonar. **Resultados e Discussão:** A busca por artigos em todas as bases de dados pesquisadas encontrou um total de 91 artigos, sendo 8 na PubMed/MedLine, 11 na Lilacs, 19 na SciELO e 55 na plataforma PEDro, após análise dos critérios de inclusão 8 artigos foram selecionados para essa revisão. A totalidade dos artigos descritos nessa revisão mostra, que todos os autores mesmo que em cenário diferentes buscaram a melhora dos sintomas através de protocolos de tratamento associando exercícios respiratórios com exercícios ativos e aeróbicos, encontrando resultados como diminuição na fadiga, dispneia e fraqueza muscular e aumento na capacidade funcional e na qualidade de vida. **Conclusão:** A

abordagem fisioterapêutica traz grandes benefícios aos pacientes com comprometimento pulmonar em decorrência a COVID-19, reduzindo sequelas e apresentando resultados positivos no estado clínico geral, comprovando sua importância e eficácia na abordagem desses pacientes pós COVID -19.

Palavras-chave: COVID-19; Comprometimento Pulmonar; Fisioterapia; Abordagem terapêutica

ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NAS PRINCIPAIS DISFUNÇÕES SEXUAIS FEMININAS - UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Beatriz Leandro Santos¹

Natalia Isabel Dos Santos¹

Raphaela Soares Ribeiro¹

Regina Maria Silva de Oliveira¹

Jennifer Grace Barros Alvino²

1 Discente, Curso de Fisioterapia, Centro Universitário das Américas – FAM

2 Docente, Curso de Fisioterapia, Centro Universitário das Américas – FAM

RESUMO

Introdução: De modo geral, as disfunções sexuais são caracterizadas pela falta, excesso, desconforto ou dor na expressão da resposta sexual. Consistem em inúmeras desordens, como distúrbio da excitação feminina, do desejo sexual hipoativo, dispareunia e vaginismo. **Objetivo:** Descrever condutas fisioterapêuticas para o tratamento das disfunções sexuais femininas. **Método:** Foi realizada a busca por artigos científicos nas bases de dados SCIELO, LILACS, BVS e PUBMED, utilizando as palavras-chave (tratamento), (abordagem) (disfunções sexuais femininas), (fisioterapia). Como critério de inclusão foram utilizadas abordagens fisioterapêuticas na fase de tratamento das disfunções citadas. Como critério de exclusão, artigos de revisão bibliográfica, revisão sistemática que não abordavam o tema proposto. **Resultados:** O tipo de estudo predominante foi o relato de casos e estudo de caso, representando 90% dos casos, com os ensaios clínicos controlados correspondendo aos restantes 10%. **Conclusão:** Conclui-se que a revisão integrativa visa fornecer uma visão abrangente da eficácia das abordagens fisioterapêuticas no tratamento das disfunções sexuais que mais acometem as mulheres. A fisioterapia é um avanço relativamente recente no tratamento dessas disfunções e seu papel exato é pouco conhecido pela população e pelos profissionais de saúde.

Palavras-chave: Disfunções Sexuais; Tratamento; Fisioterapia.

LESÕES PULMONARES ASSOCIADAS AO USO DE CIGARRO ELETRÔNICO (EVALI) - REVISÃO LITERÁRIA

Gabriela Rocha Suffi¹

Sarah Dos Santos¹

Thainá Cristina Notaroberto Marcandali De Barros¹

Gabriela da Silva Chaves²

Sergio Ayama²

1 Discente, Curso de Fisioterapia, Centro Universitário das Américas – FAM

2 Docente, Curso de Fisioterapia, Centro Universitário das Américas – FAM

RESUMO

Durante o período da adolescência ou entre adultos, comportamentos de risco são comuns, como o uso de substâncias nocivas. Dentro dessas substâncias e dispositivos, podemos encontrar o cigarro eletrônico ou o vaporizador pessoal. A lesão pulmonar associada ao vaping e cigarros eletrônicos (EVALI) é uma resposta inflamatória nos pulmões a partir da inalação que é formada dos produtos químicos potencialmente tóxicos presentes no vaping. O presente estudo buscou apresentar os danos respiratórios desenvolvidos em indivíduos sob o uso do cigarro eletrônico. Trata-se de uma revisão literária na qual foi realizado um levantamento bibliográfico nos bancos de dados da PubMed. Foram utilizados artigos na língua inglesa e portuguesa publicados no período de 2018 a 2023. Conclui-se que por ser uma novidade, faz-se necessário mais evidências a fim de aprofundar o conhecimento e a construção de protocolos que contribuam para uma promoção e ou reabilitação para esses usuários e atuação da fisioterapia em relação ao EVALI

Palavras-chave: Vaping; Fisioterapia; EVALI; DPOC; Cigarro Eletrônico; Lesão Pulmonar.

**ABORDAGEM DA FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DA ASMA NA
ATENÇÃO PRIMÁRIA: REVISÃO LITERÁRIA.**

Karen Betania Gonçalves¹

Nayara Almeida de Araujo Banti¹

Raquel Torres Gomes¹

Gabriela da Silva Chaves²

Sergio Ayama²

1 Discente, Curso de Fisioterapia, Centro Universitário das Américas – FAM

2 Docente, Curso de Fisioterapia, Centro Universitário das Américas – FAM

RESUMO

Introdução: A asma é uma doença pulmonar crônica que afeta grande parte da população mundial, seu tratamento é dividido em farmacológico e não farmacológico. Assim a fisioterapia faz parte do tratamento não farmacológico, tendo como principais objetivos a diminuição do desconforto respiratório, e a dispneia, melhorando a mecânica respiratória, a força muscular respiratória, o condicionamento cardiorrespiratório, melhorando assim a qualidade de vida do paciente. No SUS o atendimento da asma pode ser realizado nos níveis de atenção primária, secundária e terciária. Na atenção primária é realizado o diagnóstico, o tratamento, o controle e o acompanhamento da patologia. Em 1994 foi criado o programa de saúde da família (PSF) e em 2008 para fortalecer esse programa foi criado o núcleo de apoio a família (NASF) que atualmente chama-se NASF-AB, onde o fisioterapeuta foi inserido na atenção básica à saúde atuando assim no tratamento, reabilitação, controle de riscos e danos, realizando atendimentos tanto individuais como em grupos. **Objetivos:** Apresentar e descrever a importância e as dificuldades da atuação do fisioterapeuta na asma na atenção primária. **Metodologia:** Esta é uma revisão sistemática da literatura, realizada a partir de uma coleta de dados de artigos científicos em português das seguintes bases eletrônicas: Scielo e LILACS. **Resultados:** Na busca realizada utilizando o cruzamento das palavras-chaves foram encontrados 672 artigos e final foram

selecionados 8 estudos para a elaboração desta revisão. **Considerações finais:** Ao desenvolver essa revisão literária foi analisado a importância do fisioterapeuta na asma na atenção primária, analisando os benefícios que este profissional pode trazer na atenção básica, e concluindo que a fisioterapia desse nível de atenção é um processo que ainda está em construção tendo obstáculos a serem superados.

Palavras-chave: Fisioterapia; Asma; Atenção Primária; Atenção Básica Reabilitação; Tratamento.

O USO DO LASER PARA TRATAR A DISTROFIA VAGINAL.

Luiz Henrique Santana da Silva¹

Maria Eduarda Almeida Marco¹

Samara Cordeiro Teixeira¹

Suelen de Lima Peguin¹

Lucia Helena Storer Ribeiro²

1 Discente, Curso de Fisioterapia, Centro Universitário das Américas – FAM

2 Docente, Curso de Fisioterapia, Centro Universitário das Américas – FAM

RESUMO

Introdução: Os tratamentos hormonais são eficazes para a distrofia vaginal, mas muitas vezes estão associados a retenção de líquidos, ganho de peso e aumento de risco de câncer, devendo ser utilizados continuamente, por longo prazo, para manter os sintomas sob controle. Além disso, muitas mulheres podem não ser candidatas para terapia hormonal devido a condições médicas pré-existentes. Nesse contexto, o laser poderia ser uma opção terapêutica, uma vez que poucas sessões resultam em melhora duradoura.

Objetivos: Avaliar a eficácia e segurança do tratamento a laser na distrofia vaginal considerando os sintomas de secura, irritação vaginal e dor durante o sexo. **Materiais e**

métodos: Foi realizada uma revisão de literatura para verificar a eficácia do laser sobre os sintomas de secura, irritação vaginal ou dor durante o sexo em mulheres com distrofia vaginal. A busca foi realizada nas bases de dados PubMed e SciELO. Foram incluídos artigos dos últimos cinco anos, disponíveis em Inglês e / ou Português, na íntegra, com mulheres diagnosticadas com distrofia vaginal, submetidas à laserterapia. Foram excluídos estudos duplicados.

Resultados: Foram encontrados 334 artigos, sendo nove artigos selecionados para esse estudo. Sete estudos eram revisão de literatura, um estudo de caso controle e um estudo experimental. Todos os autores verificaram o efeito positivo do laser sobre sintomas de secura, irritação vaginal e dor na relação sexual. Podem ocorrer efeitos colaterais com o uso do laser CO2 como desconforto, dor, queimação e sangramento após o procedimento, porém esses efeitos são, na maioria das vezes, leves e temporários. **Conclusão:** O uso do laser no

tratamento da distrofia vaginal tem se mostrado uma opção segura e eficaz para aliviar sintomas como secura, irritação vaginal e dor durante o sexo. Podem ocorrer efeitos colaterais com o uso do laser CO2, porém esses efeitos são, na maioria das vezes, leves e temporários.

Palavras-chave: Distrofia Vaginal; Laser Terapia; Laser CO2; Fotobiomodulação; Menopausa.

FATORES FUNCIONAIS QUE LEVAM A UMA REVISÃO DE PRÓTESE TOTAL DO QUADRIL PRECOCE

Adesive Vieira Primo
Fernanda Guilherme Gea¹
Rosilda Maria da Silva¹
Henry Dan Kiyomoto
Ariane Lopes dos Santos²

¹ Discente, Curso de Fisioterapia, Centro Universitário das Américas – FAM
² Docente, Curso de Fisioterapia, Centro Universitário das Américas – FAM

RESUMO

Introdução: A prótese total de quadril é uma cirurgia comum em pacientes com dor significativa e rigidez articular. No entanto, às vezes pode causar problemas e revisão antecipada, levando à necessidade de revisão. Fatores como instabilidade, flacidez excessiva, infecção, escolha incorreta da prótese e osteose podem levar à revisão prematura. A taxa de revisão precoce varia dependendo da abordagem cirúrgica utilizada, estando as abordagens posteriores associadas a uma taxa significativamente mais elevada. Outros fatores associados à revisão precoce incluem idade mais jovem, sexo feminino, obesidade, fraturas e comorbidades. Ressalta-se também a importância da técnica cirúrgica adequada e da seleção criteriosa do tipo de prótese. Pacientes com osteoses, como osteoporose ou fraturas, têm maior chance de revisão precoce devido à menor capacidade de suporte da prótese. Pós-prótese, os pacientes devem participar de um programa de reabilitação apropriado, incluindo exercícios de fortalecimento muscular, alongamento, treinamento de equilíbrio e treinamento de mobilidade, para minimizar complicações e melhorar os resultados funcionais. **Objetivo:** Investigar os motivos para a revisão precoce de próteses totais de quadril, identificando possíveis complicações cirúrgicas. **Método:** Seleção de estudos relevantes por meio de bases de dados acadêmicas, análise qualitativa e síntese sistemática. Destaque e comparação de conceitos, técnicas e achados, além de discussão de tendências e divergências na literatura. **Resultados:** Divergências e consensos encontrados na literatura ressaltam a singularidade de cada caso. A necessidade de revisão precoce da prótese total de quadril pode ser influenciada por fatores funcionais específicos para cada paciente. **Conclusão:** Destaca-se a importância da avaliação contínua pós-operatória, incentivando profissionais e pacientes a reconhecerem a necessidade de intervenção antecipada para

tratar problemas funcionais.

Palavras-chave: Cirurgia; Prótese; Revisão Precoce

**TRATAMENTO CONSERVADOR EM RUPTURA PARCIAL DE LIGAMENTO
CRUZADO ANTERIOR (LCA): REVISÃO LITERÁRIA**Bianca Menezes Silva¹Danilo Luis Tavares Leite¹Isabela Martins Lembo Cunha¹Yasmin Cristina Evangelista Arouca¹Rafael Cusatis Neto²

1 Discente, Curso de Fisioterapia, Centro Universitário das Américas – FAM

2 Docente, Curso de Fisioterapia, Centro Universitário das Américas – FAM

RESUMO

Introdução: A articulação do joelho é uma das principais e primordiais articulações para a locomoção e sustentação do corpo. A lesão parcial do LCA é frequente nos esportes de alto e baixo nível e nas maiorias dos casos trazendo grandes repercussões na função. Portanto, a intervenção do profissional da fisioterapia na reabilitação cinético-funcional em casos de lesão parcial do paciente, e também na elaboração de protocolos de prevenção de lesão parcial em LCA, se demonstra muito importante. **Objetivos:** Apresentar e descrever os benefícios do tratamento fisioterapêutico conservador em ruptura parcial do ligamento cruzado anterior. **Metodologia:** Esta é uma revisão sistemática da literatura, realizada a partir da coleta de dados de ensaios clínicos randomizados e relatos de caso, que utilizaram um protocolo conservador e cirúrgico de reabilitação de ligamento cruzado anterior. Para a elaboração deste estudo, foram selecionados artigos científicos publicados nos idiomas inglês e português, no intervalo de 10 anos (2013 a 2023), em seres humanos, que estivessem indexados nas seguintes bases de dados eletrônicas: Scielo e PubMed. **Resultados:** Na busca realizada, utilizando o cruzamento de palavras-chaves, foram encontrados 22 artigos, e ao término da aplicação dos critérios de elegibilidade, 5 estudos foram selecionados para elaboração desta revisão. **Considerações finais:** Ao desenvolver esta revisão literária, foram analisados os benefícios do tratamento conservador em ruptura parcial do LCA em comparativo ao tratamento cirúrgico, seguindo o pressuposto de que cada paciente é único e possui suas

particularidades. Levando em consideração os sinais e sintomas do paciente após avaliação clínica, a fisioterapia possui um papel fundamental no processo de prevenção, reabilitação e inserção de indivíduo na sociedade, atuando na recuperação da lesão e na autoestima do paciente.

Palavras-chave: Reabilitação; Tratamento Conservador; Ligamento Cruzado Anterior e Lesão Parcial.